

NOTES SUR LES CURCULIONIDES

par **Albert Bovie.**

TROISIÈME PARTIE (1).

1. — **Alcides Anceyi**, nom nouveau pour *humerosus* ANCEY, *Le Natur.*, 3, 1881, p. 461 (nec HAROLD, *Monatsbl. Berl. Ac.*, 1880, p. 265).

2. — **Alcides Olivieri**, nom nouveau pour *salcatulus* OLIVIER, *Ent.*, 5, 1807, 83, p. 203 (nec FABRICIUS, *Syst. El.*, 2, 1801, p. 474).

3. — **Alcides Pascoei**, nom nouveau pour *guttulatus* PASCOE, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5) 11, 1883, p. 125 (nec THOMSON, *Arch. Ent.*, 2, 1858, p. 134).

4. — **Brachycerus milleporellus**, nom nouveau pour *milleporus* GYLLH, *Schh. Gen. Curc.*, 1, 1883, p. 435 (nec WIEDEMANN, *Germ. Mag.*, 4, 1821, p. 162).

5. — **Polytelidius** nov. gen. — Je crée ce nouveau genre pour le *Polydus Guérini* FAHRS. Cet insecte, outre son faciès tout particulier, se différencie des autres *Polydus* par ses élytres couvertes de côtes, les bords latéraux du prothorax irréguliers, ses lobes oculaires faibles, anguleux et pourvus de vibrisses, les antennes médiocres, leur massue oblongue.

Une seule espèce connue : *P. Guérini* FAHRS, *Schh. Gen. Curc.*, 5, 1840, p. 743.

6. — **Polydus Pascoei** n. spec. — Long. 10 mill. (rostre exclus). — Noir, mais entièrement couvert de petites écailles d'un bleu foncé. Thorax finement et densément ponctué, à côtés latéraux droits. Elytres régulièrement et profondément striées, les stries profondément et régulièrement ponctuées. Interstries finement et densément ponctuées. Dessous, cuisses et tibias couverts de nombreuses écailles d'un bleu foncé.

Habitat : Nouvelle Grenade.

7. — **Polydus Donceli** (SHARP *i. litt.* ?) — Cette espèce m'a été envoyée autrefois sous ce nom, mais je n'ai pu en trouver la description. Ne sachant s'il ne s'agit pas d'une espèce *in litteris*, je la décris ci-après :

Long. 8 mill. (rostre exclus). Noir, recouvert d'assez nombreuses

(1) Voir Ann. Soc. Ent. Belg., LI, p. 326 (1907).

écailles blanches. Prothorax à côtés latéraux un peu arrondis, finement et densément ponctué. Elytres régulièrement et fortement striées, les stries profondément et régulièrement ponctuées. Cuisses couvertes d'écailles blanches. Tibias couverts d'une villosité jaunâtre.

Habitat : Costa Rica.

Des figures de ces deux espèces paraîtront dans le *Genera Insectorum*, fascicule *Entiminae*, dont j'ai remis le manuscrit en décembre dernier.

8. — **Compsus Marshalli** n. spec. — Long. 17 mill. (rostre exclus). Noir, couvert sur les élytres, le dessus du thorax et de la tête de nombreuses écailles d'un vert doré métallique. Tête finement ponctuée. — Thorax fortement et régulièrement arrondi sur les côtés, aplati au-dessus, fortement chagriné, couvert d'écailles vert métallique plus abondantes sur les côtés qu'au-dessus. Elytres couvertes de gros points enfoncés, à bords irréguliers, couvertes d'écailles d'un vert doré métallique brillant beaucoup plus abondantes sur les côtés, l'extrême bord latéral restant toutefois noir. Dessous noir, très finement ponctué et n'offrant d'écailles vertes qu'à la naissance de la première paire de pattes où elles forment de chaque côté une petite plaque d'un vert brillant. Antennes et pattes noires, celles-ci très finement ponctuées et ne montrant que quelques rares écailles métalliques.

Habitat : Colombie.

Je dédie cette espèce à mon éminent collègue M. G. A. K. MARSHALL.
